Extracción de ADN de *Trypanosoma cruzi* mediante tratamiento con bromuro de hexadecil-trimetil-amonio

Marcela Escalante¹, Marleny Montilla², R. Santiago Nicholls²,
Patricia Del Portillo³, Concepción J. Puerta¹

Resumen

En el presente trabajo se describe un método rápido, sencillo y eficaz para la obtención de ADN genómico de *Trypanosoma cruzi*, libre de impurezas y fácil de manipular. Dicho procedimiento se basa en la lisis del parásito con SDS y remoción de proteínas mediante la digestión con proteinasa K, seguida de la precipitación selectiva de carbohidratos y proteínas residuales con bromuro de hexadecil-trimetil-amonio (CTAB). Finalmente, el ADN se extrae con cloroformo: alcohol isoamílico y se recupera de la fase acuosa mediante precipitación con isopropanol.

Summary

The present work describes a fast, simple and efficient method of isolating pure and easily handling of genomic DNA from *Trypanosoma cruzi*. This protocol is based on parasite lysis with SDS and the removal of proteins by digestion with proteinase K, followed by polysaccharides and remaining proteins' selective precipitation with CTAB. Finally, the DNA is extracted with chloroform-isoamyl alcohol and is recovered from the aqueous supernatant by isopropanol precipitation.

Trypanosoma cruzi, el agente etiológico de la enfermedad de Chagas, es un protozoo parásito que pertenece a la familia *Trypanosomatidae*, cuyos miembros se caracterizan no sólo por la presencia de estructuras únicas, como el cinetoplasto y el glicosoma, sino por la ocurrencia de mecanismos genéticos tales como la transcripción policistronica, la transcripción discontinua y la edición del ARN mitocondrial (1-3).

Tradicionalmente, el interés en el estudio de los tripanosomátidos era de carácter médico y veterinario debido a las enfermedades ocasionadas por los mismos, como la enfermedad de Chagas (4), la leishmaniasis (5), la enfermedad del sueño (6) y la tripanosomiasis bovina (7). Actual-

mente, dadas las características bioquímicas y genéticas peculiares de los miembros de esta familia, estos parásitos constituyen uno de los modelos más llamativos de investigación básica en el campo de la biología molecular.

Dentro del anterior contexto, surge la necesidad de encontrar métodos alternativos para la extracción de ADN de estos parásitos, que permitan agilizar procedimientos tales como el tamizaje de mutantes o transfectantes (8). Es así como, en el presente trabajo, se describe un procedimiento rápido, sencillo y eficaz, que permite la obtención de ADN libre de impurezas y fácil de manejar.

¹ Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana, Santa Fe de Bogotá.

² Laboratorio de Parasitología, Instituto Nacional de Salud, Santa Fe de Bogotá.

³ Corporación Corpogen, Santa Fe de Bogotá.

Materiales y métodos

Parásitos: se emplearon seis cepas colombianas de *Trypanosoma cruzi* (cuadro 1) en este estudio. La obtención de dichos parásitos en masa (200-300 mL) se realizó en medio líquido REI modificado (infusión de cerebro-corazón 10 g/L, NaCl 8 g/L, KCl 4 g/L, MgSO₄·7H₂O 0,2 g/L, Na₂HPO₄ 0,06 g/L, CaCl₂ 0,07 g/L, glucosa 2 g/L, NaHCO₃ 1 g/L) suplementado con 2% de suero fetal bovino (SFB) y 100 mg/mL de gentamicina, a 24°C (9).

Extracción del ADN: una vez obtenida la masa de parásitos en fase logarítmica de crecimiento (200-300 mL), se recolectó mediante centrifugación a 3.000 rpm durante 20 min, y se lavó con solución tampón TE (tris-HCl 10 mM, EDTA 1 mM, pH 7,4). Tras la última centrifugación, los parásitos fueron resuspendidos en solución tampón de lisis a una concentración final de SDS al 1% y proteinasa K (Sigma) a 25 µg/mL, e incubados durante 1 h a 65°C. Posteriormente, la suspensión se ajustó a 0,7 M de NaCl y se adicionó una mezcla de bromuro de hexadecil-trimetilamonio (CTAB) (Sigma) al 10% en 0,7 M de NaCl, durante 20 min. a 65°C. Transcurrido este período,

el ADN fue extraído (V:V) con cloroformo-isoamílico 24:1 y precipitado con 6 volúmenes de isopropanol. Finalmente, la madeja de ADN obtenida se lavó con etanol al 70% y se resuspendió en TE.

El ADN extraído se analizó mediante electroforesis horizontal en geles de agarosa al 1%, utilizando TAE como solución tampón (tris-HCl 0,04 M pH 7,2, ácido acético glacial 29,6 mM y EDTA 2 mM pH 8), con posterior tinción con bromuro de etidio (Sigma), a una concentración final de 0,5 µg/mL de agua destilada (10).

Finalmente, la concentración del ADN obtenido se midió por espectrofotometría a UV a 260 nm, teniendo en cuenta que 1 unidad de densidad óptica (DO) de 260 nm equivale a 50 µg/mL de ADN de doble cadena (10).

Digestión del ADN de los parásitos: se digirieron 2 µg de ADN con diferentes endonucleasas de restricción, utilizando una relación de 10:1 de enzima/µg de ADN. Las hidrólisis se realizaron en un volumen de 30 µL, durante 16 h a 37°C.

Estudios de Southern blot: una vez digerido el ADN, los fragmentos resultantes fueron sometidos

Cuadro 1. Características de las cepas de *Trypanosoma cruzi* en estudio.

Cepa	Código	Procedencia	Aislamiento	Origen
1	MHOM/CO/86	Chiriguaná Cesar	Hemocultivo	Humano
2	MHOM/CO/87	Paratebueno, Cundinamarca	Hemocultivo	Humano
Munanta	IRHO/CO/85 Munanta	Munanta, Guateque, Boyacá	Materia fecal de pito	<i>R. prolixus</i> Domiciliario
Shubacbarina	IRHO/CO/95 Shubacbarina	Shubacbarina Catatumbo Norte de Santander	Materia fecal de pito	<i>R. prolixus</i> Silvestre
Ikiakarora	IRHO/CO/95 Ikiakarora	Ikiakarora Catatumbo Norte de Santander	Materia fecal de pito	<i>R. prolixus</i> Silvestre
<i>D. marsupialis</i> No 3	MDID/CO/87 No.3	Astilleros El Zulia, Norte de Santander	Hemocultivo	<i>D. marsupialis</i> Silvestre
<i>D. marsupialis</i> R-56	MDID/CO/88 R-56	El Callejón Ricaurte, Cundinamarca	Hemocultivo	<i>D. marsupialis</i> Silvestre

dos a electroforesis horizontal en geles de agarosa al 0,8% y transferidos a membranas de nylon neutras (Magnagraph MSI, Fisher), siguiendo el protocolo de transferencia salina, descrito por Southern en 1975. Posteriormente, los filtros fueron sometidos a una reacción de prehibridación durante 2 h a 42°C en 50% de formamida, 0,12 M de Na_2HPO_4 pH 7,2, 0,25 M NaCl, 7% SDS, 1 mM EDTA y 200 μg de ADN de esperma de salmón denaturado, por mL de solución. Seguidamente, los filtros fueron hibridados con el gen que codifica para la histona H2A de *T. cruzi* (12), marcado con biotina y previamente denaturado, en una solución nueva de la mezcla anterior, a 42°C durante 24 h.

Transcurrida la hibridación, los filtros se enjuagaron brevemente en una solución de SSC 2X - SDS al 0,5% (p/v) a temperatura ambiente y se lavaron durante 15 min a temperatura ambiente y agitación constante, con cada una de las siguientes soluciones: SSC 1X - SDS al 0,5 % (p/v), SSC 0,5X - SDS al 0,5% (p/v) y SSC 0,1X - SDS al 0,5% (p/v).

Finalmente, una vez se secaron los filtros, se procedió a la reacción de detección con el conjuga-

do fosfatasa alcalina-estreptavidina, según lo recomendado en el manual del *Photogen Detection System* (Gibco-BRL), seguido del revelado de las señales con el sustrato NBT/BCIP (Gibco-BRL).

Resultados

Obtención del ADN de los parásitos

Los ADN genómicos de las distintas cepas de *T. cruzi* en estudio fueron extraídos según lo indicado en materiales y métodos. En la figura 1 se aprecia el grado de pureza de los distintos ADN y la ausencia de ARN. Este resultado está de acuerdo con la relación obtenida de absorbancia A_{260}/A_{280} (10), la cual se ubica dentro de los rangos permitidos (1,8 a 2,0) en todas las muestras obtenidas. De otra parte, el rendimiento obtenido con este método es bastante alto ya que se obtiene alrededor de 1 μg de ADN por cada mL de cultivo crecido en fase exponencial (10^6 parásitos/mL).

Digestión del ADN con enzimas de restricción

Los ADN extraídos fueron fácilmente digeridos en su totalidad con diversas endonucleasas que presentan diferentes longitudes en sus dianas de restricción. Bam HI, EcoR I, Hind III, Kpn I y Sph I,

Figura 1. Electroforesis horizontal en geles de agarosa al 1% del ADN genómico de los parásitos, teñido con bromuro de etidio: 1) marcador de peso molecular, 1Kb ladder (Gibco-BRL); 2) ADN de la cepa 2; 3) ADN de la cepa 3; 4) ADN de la cepa *D. marsupialis* No. 3; 5) ADN de la cepa *D. marsupialis* R-56; 6) ADN de la cepa Shubacbarina; y 7) ADN de la cepa Ikiakarora.

con cinco nucleótidos en su diana, BstE II, con siete nucleótidos y Not I con ocho nucleótidos. En la figura 2, se muestran los resultados obtenidos tras la digestión con la endonucleasa BstE II.

Southern blot

En la figura 3, se puede apreciar el patrón característico de restricción de los genes codificantes para la histona H2A de *T. cruzi*, con la enzima Sph I, consistiendo en las señales de hibridación correspondientes a las unidades de 0,76 y 1,2 kb (12).

Discusión

La mayoría de los protocolos empleados para la obtención de ADN genómico de tripanosomátidos consiste en la lisis del parásito con detergentes en la presencia de proteasas (13-15) o con agentes denaturantes como el cloruro de guanidina (16), seguida de una serie de extracciones con fenol,

fenol:cloroformo:alcohol isoamílico y cloroformo: alcohol isoamílico y recuperación del ADN mediante precipitación con etanol.

En este trabajo, se realizaron algunas modificaciones tales como el tratamiento de los parásitos lisados con CTAB. Este detergente tiene la propiedad de formar complejos con polisacáridos y proteínas (17), de manera que su unión a las proteínas residuales y grupos carbohidratos presentes en los parásitos lisados permite la obtención de un ADN libre de contaminantes que, en un momento dado, pueden afectar la calidad del mismo, al interferir con la actividad de las endonucleasas de restricción, cinasas, ligasas y otras enzimas de uso frecuente en biología molecular.

Adicionalmente, el procedimiento descrito en este trabajo obvia pasos como las extracciones con fenol y fenol:cloroformo:alcohol isoamílico, de for-

Figura 2. Electroforesis horizontal en geles de agarosa al 0,8% del ADN genómico de los parásitos digeridos con BstE II: 1) patrón de peso molecular, fago ϕ gt11 digerido con Hind III (Gibco-BRL); 2) ADN de la cepa 2; 3) ADN de la cepa 3; 4) ADN de la cepa *D. marsupialis* No. 3; 5) ADN de la cepa *D. marsupialis* R-56; 6) ADN de la cepa Shubacbarina; 7) ADN de la cepa Ikiakarora; y 8) ADN de la cepa Munanta.

Figura 3. Estudio de RFLP (*restriction fragment length polymorphisms*) después de la digestión con SphI. 2 µg de ADN de epimastigotes de *T. cruzi* de las cepas: 1) Shubacbarina; 2) Munanta; 3) cepa 3; 4) Ikiakarora; 5) *D. marsupialis* R-56; 6) *D. marsupialis* No. 3; 7) cepa 2; y 8) Y, fueron digeridos con la enzima SphI e hibridados con la unidad 1,2 Kb codificante para la histona H2A de dicho parásito, marcada con biotina. A la derecha, se indican los tamaños, en Kb, de los fragmentos HindIII del fago Lambda gt11.

ma que no sólo se reduce el tiempo, sino que se evita el uso de reactivos tóxicos y corrosivos como el fenol, cuya manipulación requiere del uso de campanas de extracción. Así mismo, en el protocolo propuesto, a diferencia de los referidos anteriormente, no se requiere del tratamiento con ARNasas, de tal forma que se acorta aún más el tiempo del procedimiento, así como también los gastos del mismo.

A diferencia de la mayoría de los procedimientos para extraer ADN genómico de tripa-nosomátidos (13-16) que precipitan el mismo con etanol, en el método que se describe, dada la eliminación previa de carbohidratos y proteínas residuales, se utiliza isopropanol, permitiendo así la obtención de una cantidad considerable de ADN ($1 \mu\text{g}/10^6$ parásitos).

El tratamiento con CTAB ha sido ampliamente utilizado en el aislamiento de ADN cromosómico de bacterias gramnegativas como *Rhizobium* (18) y *Chlamydia pneumoniae* (19) y de *Mycobacterias* (20), las cuales normalmente producen grandes cantidades de polisacáridos, así como también en la obtención de ADN de alto peso molecular en plantas (21). *T. cruzi* es un proto-

zoario que posee una gran cantidad de glicoconjugados en su membrana, tales como oligosacáridos presentes en complejos como el lipídopéptido glicano y glicoproteínas, algunas de las cuales son exportadas al medio (22-23), de manera que la extracción de ADN con CTAB, remueve estos polisacáridos, logrando un ADN libre de contaminantes y fácil de manipular, en un tiempo relativamente corto, lo cual permite un análisis ágil de mutantes o transfectantes, así como también la utilización del ADN obtenido en ensayos de *Southern blot* y PCR, entre otros.

Agradecimientos

A la doctora Genoveva Keyeux, del Instituto de Genética de la Pontificia Universidad Javeriana, por el préstamo de las cámaras fotográficas y transiluminador UV de su laboratorio, así como al doctor Jaime Bernal del Departamento de Química de la Pontificia Universidad Javeriana, por su colaboración en el uso de equipos de laboratorio.

Este trabajo se realizó con el apoyo financiero de la Fundación para la Promoción de la Investigación y la Tecnología del Banco de la República, Santa Fe de Bogotá, Colombia.

Referencias

1. **Thomas MC, Fernández A, Moro A, García JA, González A.** Biología molecular de los tripanosomátidos. En: López MC, Rivas L, editores. Parasitología molecular: nuevas tendencias. Madrid: CSIC; 1993:135-43.
2. **Vanhamme L, Pays E.** Control of gene expression in *Trypanosomes*. Microbiol Rev 1995;6:223-40.
3. **Boothroyd JC.** Molecular biology of *Trypanosomes*. In: Wiley DJ, editor. Modern parasite: biological, cellular, immunological and molecular aspects. New York: W. H. Freeman; 1990:333-47.
4. **Tanowitz HB, Kirchhoff LV, Simon D, Morris SA, Weiss LM, Witner M.** Chagas' disease. Clin Microbiol Rev 1992;5:400-19.
5. **Chang KP, Chaudhuri G.** Molecular determinants of *Leishmania* virulence. Ann Rev Microbiol 1990; 44:499-529.
6. **Cross GAM.** Cellular and genetic aspects of antigenic variation in *Trypanosomes*. Ann Rev Immunol 1990;8:83-110.
7. **Dirie MF, Otte MJ, Thatthi R, Gardiner PR.** Comparative studies of *Trypanosoma (Duttonella) vivax* isolates from Colombia. Parasitology 1993; 106:21-9.
8. **Parsons M.** Current concepts in stage-regulated gene expression in *Kinetoplastida*. Parasitol Today 1990;6:244-7.
9. **Duque S, Peláez D, Corredor A.** Normas para el cultivo *in vitro* de parásitos de la familia *Tripanosomatidae*. Manual de procedimientos. Santa Fe de Bogotá: Instituto Nacional de Salud; 1993:41-5.
10. **Maniatis T, Fritsh EF, Sambroock J.** Gel electrophoresis of DNA. In: Molecular cloning. A laboratory manual. Second edition. Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory; 1989:6.0-19.
11. **Southern EM.** Detection of specific sequences among DNA fragments separated by gel electrophoresis. J Mol Biol 1975;98:503.
12. **Puerta CJ, Martín J, Alonso C, López MC.** Isolation and characterization of the gene encoding histone H2A from *Trypanosoma cruzi*. Mol Biochem Parasitol 1994;64:1-10.
13. **Requena JM, López MC, Jiménez A, De la Torre JC, Alonso A.** A head tandem organization of hsp70 genes in *Trypanosoma cruzi*. Nucl Acids Res 1988;16:1393-1406.
14. **Ismail SO, Skeiky YAW, Bhatia A, Omara-Opyene LA, Gedamu L.** Molecular cloning, characterization, and expression in *Escherichia coli* of iron superoxide dismutase cDNA from *Leishmania donovani chagasi*. Infect Immun 1994; 62:657-64.
15. **Steinkraus HB, Greer JM, Stephenson DC, Langer, PJ.** Sequence heterogeneity and polymorphic gene arrangements of the *Leishmania guyanensis* gp63 genes. Mol Biochem Parasitol 1993;62:173-86.
16. **Bock JH, Langer, PJ.** Sequence and genomic organization of the hsp70 genes of *Leishmania amazonensis*. Mol Biochem Parasitol 1993;62:187-98.
17. **Wilson K.** Preparation of genomic DNA from bacteria. In: Ausbel FM, Brent R, Kingston RE, Moore DD, Smith JA, Seidman JD, Struhl K, editors. Current protocols in molecular biology. New York: Greene Publishing and Wiley Interscience; 1988;2.4.2-4.5.
18. **Meade HM, Long SR, Ruvkun CB, Brown SE, Ausubel FM.** Physical and genetic characterization of symbiotic and auxotrophic mutants of *Rhizobium meliloti* induced by transposon Tn5 mutagenesis. J Bacteriol 1982;149:114-22.
19. **Maass M, Dalhoff K.** Comparison of sample preparation methods for detection of *Chlamydia pneumoniae* in bronchoalveolar lavage fluid by PCR. J Clin Microbiol 1994;32:2626-9.
20. **Parra CA, Londoño LP, Del Portillo P, Patarroyo ME.** Isolation, characterization, and molecular cloning of a specific *Mycobacterium tuberculosis* antigen gene: identification of a species-specific sequence. Infect Immun 1991;59:3411-7.
21. **Murray MG, Thompson WF.** Rapid isolation of high-molecular-weight plant DNA. Nucl Acids Res 1980;8:4321-5.
22. **Mendoza-Previano L, Gorin PAJ, Braga AF, Scharfstein J, Previano, JA.** Chemical structure and antigenic aspects of complexes obtained from epimastigotes of *Trypanosoma cruzi*. Biochemistry 1983;22:4980-7.
23. **Pereira MEA.** Biology of *Trypanosoma cruzi*. In: Wiley DJ, editor. Modern parasite: biological, cellular, immunological and molecular aspects. New York: W. H. Freeman; 1990:65-261.